



ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY z Pododdziałami Endokrynologicznym i Gastroenterologicznym

**SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MIEJSKI
IM. JANA PAWŁA II**

82-300 Elbląg ul. Stefana Żeromskiego 22 tel. Ordynator - 2304271, Gab. lek. 2304272,
Oddział - 2304273

Nr ks.gł; 3312/291

Elbląg dnia: 11.05.2006r.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego

Nazwisko i imię : Rostankowska Sylwia **PESEL:** 20004209609 **ur.** 20.09.1996r.

Adres : 82- 300 Elbląg ul. Ogrodowa 22 A / 1

Przebywał w szpitalu od 30.04.2006r. **do** 11.05.2006r.

ROZPOZNANIE : Sepsis.Stan po zapaleniu mózgu i rdzenia.
Padaczka.

BADANIA DODATKOWE :

CRP 30.04.06: 70 mg/l /Norma do 6 mg/l / CRP 05.05.06; 108 mg/l

CRP 11.05.06 ; 7,5 mg/l

Morfologia : Leuk. 30600, LYM6%, MXD5,1 %, NEUT 88,9%, RBC 4090000, HGB11 g/dl,

HCT 34,4 %, MCV 84,1 fl, MCH 26,9 pg, MCHC 32 g/dl, PLT 289 tys/ μ l

Kontrolna leukocytoza 8200 Kreatynina ;0,5 mg/dl

Mocz badanie ogólne ; Barwa sł., lekko mętny, odczyn pH5,0, c/wł. 1030, B(+) 104,2

mg/100, C(-)nabłonki pł. nieliczne wpw, okrągłe poj.wpw. leukocyty 20-30 wpw, składniki mineralne bardzo liczne moczany bezpostaciowe, liczne pasma śluzu.

Wymaz z gardła 30.04.06; 1.Streptococcus viridens (+++) 2.Neisserie sp.(+++),3,Grzyby drożdżopodobne. (+).

Mocz na posiew 01.05.06 ; $> 10^6$ /ml Klebsiella pneumoniae

Antybiogram; Augmentin -W, Cefuroksym -W, Cefotaksym -W, Amikacyna-W,

Kotrimoksazol -W, Nitrofurantoina-SW.

Posiew moczu kontrolny - jałowy.

Posiew krwi ;Flavobacterium spp. Antybiogram; Piperacylina -W, Piperacylina/Tazobactam-W, Ceftazydym-W, Amikacyna -SW, Ciprofloksacyna -W.

Posiew krwi kontrolny-

USG 05.05.06 ; Wątroba, pęcherzyk żółciowy, PŻW, trzustka, śledziona, okolica wielkich naczyń bez zmian. W nerce lewej w okolicy bieguna dolnego drobna torbiel korowa o wym. 10 mm. Poza tym nerki o prawidłowym zróżnicowaniu korowo - rdzeniowym UKM- y nieposzerzone. Pęcherz moczowy w normie. Wolnego płynu w jamie brzusznej i miednicy małej nie widać ./lek. J. Gawieńczuk /

Ciężar ciała; 25 kg

LECZENIE ; Claforan, Cipronex, Sol.Glu,Sol.NaCl, Płyn pediatriczny.Lacidofil, Vit.C,
Paracetamol, Ibufen.

EPIKRYZA : Pacjentka w wieku 9 lat i 7 miesięcy z objawami porażenia czterokończynowego po zapaleniu mózgu i rdzenia, przyjęta do Oddziału z powodu wysokiej gorączki. W badaniu fizykalnym dziecko cierpiące, pomijając objawy porażenia, bez istotnych odchyień. Gorączkowała septycznie do 40 stopni przez 6 dni, w badaniach dodatkowych stwierdzono wysokie wykładniki zapalne. W posiewie krwi i w badaniu moczu cechy zakażenia. Zastosowano leczenie, uzyskano całkowite ustąpienie objawów septycznych i zakażenia, wypisana do domu do dalszego leczenia.

ZALECENIA POSZPITALNE: Kontrolne badanie w Poradni za tydzień.

Okresowa kontrola w Poradni Neurologicznej i Rehabilitacyjnej.

Rp. Cipronex 2 x 125 mg przez 5 dni

Kidabion 2 x 5 ml

Dalsze stosowanie Orfiril zgodnie z zaleceniem Neurologa.

Lekarz prowadzący:

Ordynator:

